

Приложение № 2 к Порядку
госпитализации пациентов
на медицинскую реабилитацию
в условиях стационара
ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России

Противопоказания к госпитализации
для проведения медицинской реабилитации пациентов в условиях стационара

1. Все заболевания в остром периоде.
2. Все заболевания в стадии декомпенсации.
3. Наличие показаний к оперативному вмешательству или применению других специальных методов лечения по профилю основного заболевания.
4. Венерические заболевания.
5. Выраженное нарушение функции, полная зависимость от посторонней помощи в осуществлении самообслуживания, перемещения и общения и не имеющим перспективы восстановления функций (реабилитационного потенциала).
6. Наличие послеоперационных осложнений.
7. Кахексия.
8. Лихорадка неясного генеза.
9. Кровотечения, кровохарканье.
10. Анемия (уровень гемоглобина менее 100 г/л).
11. Недостаточности кровообращения II Б–III ст. (ХСН ФК IV).
12. Прогностически неблагоприятные нарушения сердечного ритма и проводимости:
 - пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, возникающие дважды и чаще в месяц;
 - постоянная форма мерцательной аритмии с недостаточностью кровообращения выше II А стадии;
 - пароксизмальная тахикардия с частотой приступов более 2 раз в месяц;
 - политопная, частая, групповая и ранняя экстрасистолия (3–5-й градации по Лауну);
 - атриовентрикулярная блокада II–III степени, слабость синусового узла с эпизодами выраженной бради- и тахиаритмии;
 - полная блокада правой или левой ножек пучка Гиса (для грязелечения).
13. Артериальная гипертония 3 степени, вторичная гипертензия медикаментозно неконтролируемая, злокачественное течение.
14. Расслаивающаяся аневризма аорты.
15. Невыключенная из кровотока, верифицированная ангиографически аневризма или мальформация сосудов головного мозга.
16. Наличие окклюзий брахиоцефальных и сонных артерий, нестабильных атеросклеротических бляшек, двусторонних стенозов артерий более 60 % (по данным дуплексного сканирования магистральных артерий головы).

17. Облитерирующий тромбангиит (эндартериит) с склонностью к генерализации, при сопутствующем мигрирующем тромбофлебите, при наличии свежих изъязвлений, гангрены.
18. Рецидивирующие и/или недавние флеботромбозы глубоких вен (не ранее 6 (шести) месяцев после обострения) и тромбофлебиты поверхностных вен (не ранее 3 (трех) месяцев после обострения).
19. Дыхательная недостаточность III степени.
20. Легочно-сердечная недостаточность.
21. Бронхиальная астма любой степени тяжести с неконтролируемым течением.
22. Психические расстройства и заболевания.
23. Эпилепсия и эпилептические синдромы.
24. Пароксизмальные (синкопальные) состояния.
25. Генерализованная форма миастении.
26. Боковой амиотрофический склероз (бульбарная форма).
27. Деменция.
28. Наркотическая, алкогольная зависимости.
29. Недержание и недержание мочи.
30. Острая или хроническая задержка мочи, требующая катетеризации мочевого пузыря.
31. Хронический остеомиелит.
32. Гиперплазия предстательной железы 2–3 стадии.
33. Онкологические заболевания, за исключением наличия направления врачом-онкологом на реабилитацию.
34. Врожденные аномалии развития органов и систем, осложненные выраженными нарушениями функций органов, систем.
35. Состояния, ограничивающие по совокупности сопутствующих заболеваний применение методов медицинской реабилитации – физио-, бальнео-, механотерапии.